



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

17 MAI 2000 \*025917

## REGION LORRAINE

Bulletin technique n° 11 du 09 mai 2000

### Céréales

Les orges sont en floraison, les blés sont entre les stades sortie dernière feuille et gonflement.

#### Situation

Les orages successifs de ces derniers jours ont réalimenté le champignon de la Septoriose qui commence à atteindre une phase très active dans les secteurs les plus touchés du sud de la Lorraine. Le modèle PRESEPT indique le passage en risque moyen dans les secteurs d'Ancerville (55), Toul, Coyviller, Port/Seille (54), Château-Salins, Courcelles-Chaussy (57), Attignéville et Vittel (88). Les régions du nord de la Lorraine, les plateaux du Barrois et de Haye restent toujours en risque très faible.

### Préconisations

Dans les secteurs d'Ancerville et Toul, les traitements contre la Septoriose devront intervenir rapidement.

Dans les secteurs du sud de la Lorraine (Pont à Mousson), exceptés les plateaux du Barrois et Haye, les traitements seront à faire dans le courant de la semaine, de préférence avant les orages annoncés pour le week-end prochain.

Dans les autres secteurs, on pourra attendre le courant de la semaine prochaine.

Dans tous les cas, compte tenu du potentiel de maladie présent sur la base des plantes et de la période pluvio-orageuse annoncée pour les jours à venir, il sera préférable d'utiliser une pleine dose d'un bon fongicide appliqué soit en une seule fois soit en 2 fois (1/2 dose), la première 1/2 dose dès maintenant, la 2ème début épiaison (les résultats sont identiques).

Ne pas viser la fusariose dans l'immédiat, le risque ne pourra être évalué que début floraison. Aucun modèle n'est actuellement susceptible de prévoir l'évolution de cette maladie avant que l'on atteigne le stade début floraison.

**Septoriose :**  
Début des  
traitements.

